

Test Allergologico per Cani

PREPARATO PER: Brock Campbell
PER CONTO DI: Fido

23 Settembre 2019

Questo rapporto è basato su un'analisi di 114 allergeni comuni. Ognuno è classificato in tre modi:



Fido ha una forte intolleranza a questi allergeni.



Fido ha una lieve intolleranza a questi allergeni.



Fido non ha avuto reazioni a questi allergeni.

Analisi dettagliata



Ci sono 4 articoli che mostrano una forte intolleranza.

1. Alghe

Sebbene le alghe vengano talvolta utilizzate per aiutare i cani con allergie grazie alla sua capacità di aiutare la pelle infiammata e di respingere gli insetti, alcuni cani possono essere sensibili ad esse. I sintomi di un'intolleranza alle alghe comprendono bernoccoli, sintomi di asma, tosse, masticazione delle zone interessate, infezioni dell'orecchio, perdita di capelli, prurito, leccamento ossessivo, arrossamento, grattacapi, mancanza di respiro, starnuti e congestione nasale. Le allergie alle alghe possono essere trattate con corticosteroidi per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici per aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (alghe) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di un'intolleranza al fucio e alcuni veterinari possono anche prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



2. Frumento

Le intolleranze al frumento sono abbastanza comuni tra i cani. Un cane può anche avere un'intolleranza globale al glutine. Il frumento è un ingrediente comune in molti alimenti per cani e può essere lavorato in molti modi diversi. Un'intolleranza al frumento può causare sintomi come punti caldi, orticaria, diarrea, infezioni cutanee croniche, infezioni all'orecchio croniche, leccate ossessive e masticazioni, vomito e nausea. Infezioni cutanee secondarie possono anche verificarsi come infezioni o eruzioni cutanee. Sintomi più gravi possono anche verificarsi come convulsioni o problemi neurologici. Le intolleranze alimentari colpiscono il sistema digestivo e causano sintomi come gorgoglii nello stomaco, stitichezza e dolori addominali. A seconda della

gravità dell'intolleranza al frumento, possono essere prescritti trattamenti come antistaminici (come il Benadryl) o corticosteroidi per aiutare con prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche una forma di trattamento raccomandata. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (grano) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Gli Omega-3 e i probiotici possono anche essere raccomandati per aiutare a sostenere il sistema immunitario del cane e proteggere la pelle con un'intolleranza al grano. Gli antibiotici possono essere prescritti dal veterinario se il cane è affetto da infezioni cutanee secondarie.



3. Olio di cocco

L'olio di cocco può essere usato localmente per aiutare il mantello e la pelle del cane o come parte della sua dieta. Tuttavia, alcuni cani possono essere sensibili all'olio di cocco e dovrebbero essere introdotti alla loro dieta lentamente. Nel complesso è raro che un cane sia intollerante all'olio di cocco. Se un cane soffre di una sensibilità all'olio di cocco, i sintomi possono includere tosse, orticaria, prurito, naso che cola, infiammazione e dolore all'orecchio cronico, morso della zampa, nausea e vomito. Alcuni cani possono soffrire di dolori addominali o stitichezza se soffrono di un'intolleranza all'olio di cocco. Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono prescrivere pomate o farmaci come antistaminici e corticosteroidi. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (olio di cocco) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono spesso prescritti anche per aiutare a sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.



4. Pomodori

I pomodori sono uno dei cibi più salutari della natura, ma sfortunatamente alcuni cani potrebbero essere a loro reattivi. I pomodori fanno parte della famiglia della belladonna e mentre il pomodoro non è dannoso per i cani, le piante su cui crescono possono essere tossiche per i cani. Se si danno pomodori al proprio cane, una buona regola è quella di dar loro i più rossi. I sintomi dei cani che reagiscono alle piante di pomodori sono disturbi di stomaco, vomito e diarrea. I sintomi delle reazioni al pomodoro possono includere prurito e pelle sensibile, gas e mal di stomaco. Se il tuo cane soffre nel mangiare la pianta, potrebbe essere necessaria una visita veterinaria. La forma più efficace di trattamento per una normale sensibilità al pomodoro è evitarlo o eliminarlo dalla dieta del cane. I metodi di trattamento temporaneo comprendono creme topiche come antistaminici o corticosteroidi.



Ci sono 5 Risultati neutrali

1. Coniglio

Sebbene non sia comune, i cani possono sviluppare allergie al coniglio. La carne di coniglio può essere somministrata a cani con numerose sensibilità proteiche come nuova proteina e si trova in un certo numero di alimenti premium per cani. I sintomi di un'intolleranza al coniglio includono prurito, morso della zampa, scarsa qualità del mantello, leccata ossessiva, gas cronico, vomito, orticaria e diarrea cronica. Un'intolleranza alimentare colpisce il sistema digestivo e porta a dolori

addominali, gorgoglii nello stomaco e cambiamenti nelle feci. Per il trattamento, antistaminici e corticosteroidi sono usati come trattamenti topici per prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione si verificano quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (coniglio) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Anche gli Omega-3 e i probiotici sono raccomandati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono anche essere prescritti antibiotici.



2. Igname

Sebbene gli ignami offrano un valore nutrizionale eccellente ai cani, molti cani vi possono essere sensibili. I sintomi di intolleranza all'ignamo comprendono tremori alla testa, orticaria, zampe mordenti, leccare ossessivo, calvizie, gas cronico, infezioni alle orecchie croniche, tosse, diarrea, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per il trattamento, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando rimuovi completamente la sospetta intolleranza (igname) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di intolleranza al gallo, pertanto alcuni veterinari potrebbero prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



3. Olio di semi di cotone

L'olio di semi di cotone è un grasso comune usato nel cibo per cani. Alcuni cani non sono in grado di tollerare l'olio di semi di cotone. Se un cane soffre di una sensibilità all'olio di semi di cotone, i sintomi includono tremori della testa, gas cronico, infiammazione e dolore cronico all'orecchio, tosse, orticaria, prurito, naso che cola, morsi della zampa, nausea e vomito. Alcuni cani possono soffrire di dolori addominali o stitichezza se soffrono di un'intolleranza all'olio di semi di cotone. Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono prescrivere pomate o farmaci come corticosteroidi e antistaminici. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (olio di semi di cotone) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono spesso prescritti anche per aiutare a sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.



4. Patate dolci

Le patate dolci sono un'ottima fonte di fibre, vitamina B6, vitamina C e beta carotene. Possono essere trovate in numerosi alimenti e prelibatezze per cani. Tuttavia, alcuni cani possono essere sensibili alle patate dolci. I sintomi di un'intolleranza alla patata dolce includono tremori di testa, orticaria, zampe mordenti, leccate ossessive, tosse e diarrea, vomito e respiro affannoso. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per il trattamento, gli antistaminici possono aiutare con prurito e sono raccomandati corticosteroidi per aiutare a ridurre il gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (patata dolce) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di una intolleranza alle patate dolci e alcuni veterinari possono prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



5. Sorgo

Il sorgo viene talvolta usato come alternativa al riso nei cibi per cani. È anche senza glutine e può essere usato come sostituto del grano. Anche se non comune è del tutto possibile per un cane non tollerare il sorgo. Un'intolleranza al sorgo può causare sintomi come punti caldi, orticaria, diarrea, infezioni cutanee croniche, infezioni all'orecchio croniche, leccate ossessive e masticazione, vomito e nausea. Infezioni cutanee secondarie possono anche verificarsi come infezioni o eruzioni cutanee. Sintomi più gravi possono anche verificarsi come convulsioni o problemi neurologici. Le intolleranze alimentari colpiscono il sistema digestivo e causano sintomi come gorgoglii nello stomaco, stitichezza e dolori addominali. A seconda della gravità dell'intolleranza al sorgo, possono essere prescritti trattamenti topici come antistaminici (come il Benadryl) o corticosteroidi per aiutare con prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche una forma di trattamento raccomandata. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (sorgo) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Gli Omega-3 e i probiotici possono anche essere raccomandati per aiutare a sostenere il sistema immunitario del cane e proteggere la loro pelle con un'intolleranza al sorgo. Gli antibiotici possono essere prescritti dal veterinario se il cane è affetto da infezioni cutanee secondarie.



Ci sono 105 Risultati negativi

Acari della polvere	Agnello	Ananas
Anatra	Anguria	Arancia
Avena	Banana	Barbabietola rossa
Barbabietole	Bok Choy	Broccoli
Brodo di pesce	Bufalo/Bisonte	Burro di arachidi
Cagliata di fagioli	Carota	Cavoletti di Brussels
Cavolfiore	Cavolo	Ceci
Cereali	Cetriolo	Cozza da labbre verdi
Crostacei	Crusca di riso	Erba
Fagioli di Lima	Fagioli marini	Fagioli Pinto
Fagioli rossi	Fagiolini verdi	Falene
Farina d'avena	Farina di pesce	Formaggio
Formiche	Fragole	Funghi
Gelatina	Glicole Propilenico Etere	Glucosamina
Grano saraceno	Ippoglosso	Kale - Cavolo verde
Lampone	Latticini	Lecitina
Limone	Limonene	Maiale
Mais	Mango	Manzo
Mela	Melassa	Merluzzo
Mirtilli rossi	Mirtillo	More
Mosca domestica	Olio di Canola	Olio di fegato di merluzzo
Olio di girasole	Olio di mandorle	Olio di Oliva
Olio di semi di lino	Olio vegetale	Orzo
Patate	Pera	Pesche
Piselli verdi	Piume	Polline
Pollo	Pulci	Rape
Riso bianco	Riso del birrifico	Riso integrale
Salmone	Sardine	Scarafaggio
Sciroppo di mais	Sedano	Sgombro
Siero di latte	Soia	Spinaci
Tabacco	Tacchino	Tapioca
Tempeh	Tonno	Uova di anatra
Uova di pollo	Verdure verdi	Yogurt
Yucca	Zanzare	Zenzero
Zucca	Zucca 'Squash'	Zucchini

Allergy Test My Pet è progettato per testare le sensibilità del proprio cane, non le allergie vere che sono immediate e possono avere gravi conseguenze. I test di sensibilità indicano una risposta ritardata da parte degli anticorpi del proprio cane all'allergene da testare.

Questo test è stato progettato per aiutare ad apprendere le sensibilità che il proprio cane potrebbe avere, in modo da poter comprendere meglio ciò che il proprio animale domestico potrebbe non essere in grado di tollerare. Ci sono un certo numero di opzioni disponibili per affrontare queste sensibilità. Consigliamo di discuterne con il proprio veterinario per trovare la soluzione migliore. Questo può includere l'introduzione di una nuova dieta per il proprio cane, eliminando determinati alimenti e farmaci.

Questo test non ha lo scopo di offrire consulenza medica e se il proprio cane sta mostrando sintomi consigliamo di chiedere il parere di un professionista. Speriamo che questo test metterà il proprio cane sulla strada giusta per il benessere.